フェーリング反応

(氏名：)

目的：フェーリング反応を起こさせて、糖が還元性を持つことを確認する。

(フェーリング反応：還元糖が2価の銅イオン Cu^{2+} を還元すると、赤褐色の酸化銅 (I) Cu_2O の沈殿が生成する。)

実験前準備

1. 実験器具・機器

- ・ グルコース (1%)
- ・ フルクトース (1%)
- ・ スクロース (1%)
- ・ 上白糖 (1%)
- ・ 黒糖 (1%)
- ・ 試験管
- ・ 三脚
- ・ ガスバーナー
- ・ 金網
- ・ ピーカー

2. 試薬

・ フェーリングA液

(硫酸銅6.9 g を100mlにメスアップ)

・ フェーリングB液

(酒石酸カリウムナトリウム 34.6 g と水酸化ナトリウム 10 g を純水に溶かして100mlにメスアップ)

3. 調合・調整

- 1) 可溶性デンプン 1 g を100mlの純水に加熱溶解する
- 2) 各種糖質1gを100mlの純水に溶解する。(可溶性の場合)

実験手順

実験開始

フェーリングA液とB液を1ml試験管に取る (5本)

1mlの糖溶液を加える (試験管に糖名を記す!)

糖溶液を加える

加熱する前は
何色の溶液?

沸騰したビーカーに5本とも入れ、加熱する。

やけどに
注意!

溶液はどのよう
に変化した?

沈殿してできた
物質は何だろ
う?

反応を観察する。

実験終了

なぜ、一部の糖
質が変化したの
だろう?